



MEJORANDO LA COBERTURA DEL PAP EN EL CESFAM NORTE DE LOS ANGELES, A TRAVES DEL ABORDAJE INTEGRAL DE BARRERAS

Marta Aravena Frindt; Teresa E. Briones Toloza; Rosa Cortés Gutiérrez;
Mario Medina Martínez; Leopoldo Oyaneder Rozas; Leonardo Ramiro
Reyes



MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES
DIRECCION COMUNAL DE SALUD



UNIVERSIDAD DE CHILE
ESCUELA DE SALUD PUBLICA
PROYECTO PIEDRA BIO BIO



MINISTERIO DE SALUD
SERVICIO DE SALUD BIO BIO



Asociación
Chilena de
Municipalidades

Hacia la reforma municipal
COMISIÓN SALUD



Antecedentes del Proyecto

- Existe mortalidad evitable por Cáncer Cervicouterino
- Objetivos Sanitarios década 2000-2010
- Situación Mortalidad por Cáncer Cervicouterino en provincia de Biobío, Región Biobío y país
- Cáncer Cervicouterino y exámenes de pesquisa



SITUACIÓN MUNDIAL DEL CÁNCER EN LA MUJER

Anualmente se producen alrededor de 10 millones de casos nuevos esperándose alrededor de 15 millones para el año 2020 (WHO 2005)

Internacionalmente, las tres primeras causas de muerte por cáncer en mujeres corresponden en orden descendente a cáncer de mama, cáncer de pulmón y cáncer cervicouterino con tasas estandarizadas por edad entre 12,51 y 7,99 por 100.000 mujeres (Asociación Internacional de Registros de Cáncer & IARC 2002)



ANTECEDENTES GENERALES DEL CÁNCER CÉRVICOUTERINO


La OMS calcula que más de 2 millones de mujeres en el mundo tienen cáncer cervicouterino.

Se estima que todos los años se producen unos 466.000 casos nuevos de Cáncer Cervicouterino en las mujeres de todo el mundo.

La tasa de incidencia estandarizada por edad refleja una diferencia de más de 7 puntos entre los países desarrollados y los países en desarrollo (Asociación Internacional de Registros de Cáncer & IARC 2002)

Con relación a la mortalidad, la IARC indica que provoca aproximadamente 233.000 muertes de mujeres por año. El 83% de esas muertes ocurren en los países en desarrollo donde los programas de tamizaje no están bien institucionalizados o son muy poco eficaces. Al comparar la tasa ajustada de mortalidad entre estos países, resulta que en los países en desarrollo es 58,3% mayor que en los desarrollados

Incidencia¹ Cáncer de Cuello Uterino² Registros Poblacionales de Cáncer América del Sur³



1: Tasas x 100 mil mujeres, ajustadas a población mundial estándar

2: CIE-10 C53

3: Datos publicados en "Incidencia en V Continentes, IX Publicación IARC", Quinquenio 1998-2002



En Chile, el cáncer de cuello uterino constituye un importante problema de salud pública.

Cada día fallecen 26 mujeres por algún tipo de cáncer, cada 12 horas muere una mujer por Cáncer cérvico uterino

En Chile, durante el año 2002 fallecieron 632 mujeres, ocupando el cuarto lugar entre las muertes por cáncer en la mujer y el **primer lugar en la tasa de años de vida potencialmente perdidos** con 129 por 100.000 mujeres; produciendo un importante impacto social y económico, ya que afecta a mujeres relativamente jóvenes y en edad productiva (AVPP 15,628) (Depto. Epidemiología Ministerio de Salud 2005).

